

## 7.2.12 Vektorový součin I

**Předpoklady:** 7208, 7211

Při násobení dvou čísel získáváme opět číslo. Skalární násobení vektorů je zcela odlišné, protože vynásobením dvou vektorů dostaneme číslo, tedy něco jiného.

Je možné vynásobit dva vektory a získat opět vektor? Co by takové násobení muselo pro výsledek určit?

Takové násobení musí jednoznačně určit výsledný vektor, tedy jednak velikost (jako u násobení čísel a skalárního násobení vektorů) a poté směr (to je novinka).

Takový postup existuje a nazývá se **vektorový součin**.

Nejdříve si řekneme jeho význam a pak se ho naučíme spočítat pomocí souřadnic.

**Př. 1:** Rozhodni zda následující definice může být použita jako definice vektorového součinu dvou vektorů:

Vektorový součin dvou vektorů, které leží na jedné přímce je nulový vektor.

Vektorový součin dvou vektorů  $u, v$ , které neleží na jedné přímce, je vektor  $w$ , který má tyto vlastnosti:


Vektor  $w$  je kolmý k oběma vektorům  $u, v$ .

Platí:  $|w| = |u||v|\sin\alpha$ , kde  $\alpha$  je úhel vektorů  $u$  a  $v$

Vektorový součin  $w$  vektorů  $u$  a  $v$  značíme  $u \times v$ , tedy  $w = u \times v$

Předchozí definice není správná. Vektor  $w$  podle ní není určen jednoznačně.

Pokud by vektory  $u$  a  $v$  ležely ve vodorovné rovině, mohl by výsledný vektor  $w$  směřovat buď svisle vzhůru nebo svisle dolů



$\Rightarrow$  musíme doplnit pravidlo, které by jednu z možností zakázalo  $\Rightarrow$  například, že vektory tvoří pravotočivou bázi.

Správná definice vektorového součinu:

Vektorový součin dvou vektorů, které leží na jedné přímce je nulový vektor.

Vektorový součin dvou vektorů  $u, v$ , které neleží na jedné přímce, je vektor  $w$ , který má tyto vlastnosti:

- Vektor  $w$  je kolmý k oběma vektorům  $u, v$ .
- Vektory  $u, v, w$  tvoří pravotočivou bázi.

- Platí:  $|\mathbf{w}| = |\mathbf{u}||\mathbf{v}|\sin \alpha$ , kde  $\alpha$  je úhel vektorů  $\mathbf{u}$  a  $\mathbf{v}$

Vektorový součin  $\mathbf{w}$  vektorů  $\mathbf{u}$  a  $\mathbf{v}$  značíme  $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ , tedy  $\mathbf{w} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$

**Upozornění:** Existují dva způsoby násobení vektorů:

- Skalární součin (výsledek číslo)  $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$
- Vektorový součin (výsledek vektor)  $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$

$\Rightarrow$  proto při zápisu záleží na tom, který znak píšeme. Při jeho záměně totiž počítáme něco úplně jiného.

**Pedagogická poznámka:** Předchozí upozornění není zbytečné. Studenti oba typy v zápisu často zaměňují (a dělají to bohužel i po upozornění).

**Př. 2:** Rozhodni zda je vektorové násobení komutativní.

Vektorové násobení není komutativní, pokud prohodíme pořadí vektorů  $\mathbf{u}$  a  $\mathbf{v}$  obrátí se směr výsledného vektoru  $\mathbf{w}$ .


Pro každé vektory  $\mathbf{u}$ ,  $\mathbf{v}$  platí  $\mathbf{v} \times \mathbf{u} = -\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ .

**Př. 3:** Navrhni důvod, proč je vektorovým součinem vektorů ležících na jedné přímce nulový vektor.

Směrů kolmých k jedné přímce je v prostoru nekonečně mnoho  $\Rightarrow$  vektorový součin by nebyl jednoznačně určitelný.

Pro vektory na jedné přímce platí:  $\alpha = 0 \Rightarrow |\mathbf{w}| = |\mathbf{u}||\mathbf{v}|\sin \alpha = |\mathbf{u}||\mathbf{v}|\sin 0 = 0$

Podíváme se na velikost vektorového součinu  $|\mathbf{w}| = |\mathbf{u}||\mathbf{v}|\sin \alpha \Rightarrow$  “opačný“ vzorec než u skalárního součinu, čím větší úhel mezi vektory, tím větší výsledek vektorového součinu. Jaký má geometrický význam?




Geometrický význam: součin  $|\mathbf{w}| = |\mathbf{u}||\mathbf{v}|\sin \alpha$  udává obsah rovnoběžníku  $PURV$ .

**Př. 4:** Pomocí geometrického významu čísla  $|\mathbf{w}| = |\mathbf{u}||\mathbf{v}|\sin \alpha$  rozhodni, jak se změní vektorový součin pokud:

- a) k vektoru  $\mathbf{v}$  přičteme násobek vektoru  $\mathbf{u}$
- b) pokud jeden z vektorů vynásobíme reálným číslem  $k$ .

**a) k vektoru  $\mathbf{v}$  přičteme násobek vektoru  $\mathbf{u}$**

vektorový součin se nezmění, protože se nezmění ani obsah rovnoběžníku  $PURV$ .



Rovnoběžník se přičtením násobku nakloní, ale jeho obsah zůstane stejný.

**b) pokud jeden z vektorů vynásobíme reálným číslem  $k$ .**

Rozdělíme si podle znaménka  $k$ :

- $k > 0$   
Pokud jeden z vektorů vynásobíme kladným číslem  $k$  změní se jeho velikost  $k$  krát, úhel mezi vektory se nezmění  $\Rightarrow$  vektorový součin se vynásobí číslem  $k$ .
- $k = 0$   
Pokud jeden z vektorů vynásobíme 0, bude mít nulovou velikost  $\Rightarrow$  vektorový součin bude nulový  $\Rightarrow$  vektorový součin se vynásobí číslem  $k$ .
- $k < 0$   
Pokud jeden z vektorů vynásobíme záporným číslem  $k$  změní se jeho velikost  $k$  krát a jeho směr se obrátí, úhel mezi vektory se nezmění  $\Rightarrow$  vektorový součin se zvětší  $k$  krát a obrátí se jeho směr  $\Rightarrow$  vektorový součin se vynásobí číslem  $k$ .

Ve všech případech platí, že vektorový součin se vynásobí číslem  $k$ .

**Pedagogická poznámka:** Pokud je málo času, doporučuji bod b) konstatovat bez delšího rozebírání. Odpovídá běžné studentské představě.

Podobně jako u ostatních součinů i u vektorového usnadňují počítání speciální vlastnosti:

**Př. 5:** Doplň větu. Pro každé vektory  $a, b, c$  a pro každé číslo  $t \in R$  platí:

a)  $a \times (b + c) =$                                       b)  $a \times (tb) = .$

Pro každé vektory  $a, b, c$  a pro každé číslo  $t \in R$  platí:

$$a \times (b + c) = a \times b + a \times c$$

$$a \times (tb) = (ta) \times b = t(a \times b)$$


Vztahy dokážeme později. Teď konečně odvodíme vztah pro vektorový součin pomocí souřadnic.

Zvolíme si kartézskou pravotočivou soustavu souřadnic  $Oxyz$ . Osy mají takový směr, aby vektory, které mají jejich směr, tvořily pravotočivou bázi.

Každý vektor můžeme v této soustavě vyjádřit pomocí jednotkových vektorů se směru jednotlivých os. Značíme je:

- $e_1 = (1; 0; 0)$  značíme ho také  $e_x$
- $e_2 = (0; 1; 0)$  značíme ho také  $e_y$
- $e_3 = (0; 0; 1)$  značíme ho také  $e_z$

**Př. 6:** Nakresli obrázek kartézské soustavy souřadnic  $Oxyz$  a vyznač do ní vektory  $e_1$ ,  $e_2$  a  $e_3$ .



**Př. 7:** Urči vektorové součiny:

$$e_1 \times e_1 =$$

$$e_1 \times e_2 =$$

$$e_1 \times e_3 =$$

$$e_2 \times e_1 =$$

$$e_2 \times e_2 =$$

$$e_2 \times e_3 =$$

$$e_3 \times e_1 =$$


$$e_3 \times e_2 =$$

$$e_3 \times e_3 =$$

$e_1 \times e_1$ : součin dvou stejných (rovnoběžných) vektorů  $\Rightarrow e_1 \times e_1 = \mathbf{o}$

$e_1 \times e_2$ : dva různoběžné vektory  $\Rightarrow$  jejich vektorový součin je nenulový

- velikost:  $|\mathbf{w}| = |\mathbf{u}||\mathbf{v}|\sin \alpha = |e_1||e_2|\sin 90^\circ = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1 \Rightarrow$  půjde opět o jednotkový vektor




- směr: vektory  $e_1, e_2, \mathbf{w}$  tvoří pravotočivou bázi:

vektor  $\mathbf{w}$  má stejný směr jako osa  $z \Rightarrow$  hledaným vektorem je vektor  $e_3$  (má jednotkovou velikost a směr osy  $z$ )  $\Rightarrow e_1 \times e_2 = e_3$

$e_1 \times e_3$ : dva různoběžné vektory  $\Rightarrow$  jejich vektorový součin je nenulový

- velikost:  $|\mathbf{w}| = |\mathbf{u}||\mathbf{v}|\sin \alpha = |e_1||e_3|\sin 90^\circ = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1 \Rightarrow$  půjde opět o jednotkový vektor



- směr: vektory  $e_1, e_2, e_3$  tvoří pravotočivou bázi:  
vektor  $w$  má opačný směr než osa  $y \Rightarrow$  hledaným vektorem je vektor  $-e_2$  (má jednotkovou velikost a směr opačný k ose osy  $y$ )  $\Rightarrow e_1 \times e_3 = -e_2$

Stejným způsobem určíme ostatní součiny:

$e_1 \times e_1 = \mathbf{o}$	$e_1 \times e_2 = e_3$	$e_1 \times e_3 = -e_2$
$e_2 \times e_1 = -e_3$	$e_2 \times e_2 = \mathbf{o}$	$e_2 \times e_3 = e_1$
$e_3 \times e_1 = e_2$	$e_3 \times e_2 = -e_1$	$e_3 \times e_3 = \mathbf{o}$

**Pedagogická poznámka:** Součin  $e_1 \times e_1$  určí studenti většinou sami, součin  $e_1 \times e_2$  je potřeba většině z nich ukázat (proto s ním příliš nečekám), zbytek pak již dopočítají. Někteří mají potíže se znaménky.

Například vektor  $u = (2; 3; -1)$  můžeme napsat jako  $u = 2 \cdot e_1 + 3 \cdot e_2 - 1 \cdot e_3$ .

Vyjádříme vektory  $a$  a  $b$  pomocí vektorů  $e_1, e_2, e_3$ .

$$a = (a_1; a_2; a_3) = a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3$$

$$b = (b_1; b_2; b_3) = b_1 e_1 + b_2 e_2 + b_3 e_3$$

Teď oba vektory vynásobíme a použijeme pravidla na roznásobení:

$$a \times b = (a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3) \times (b_1 e_1 + b_2 e_2 + b_3 e_3) =$$

$$a_1 e_1 \times b_1 e_1 + a_2 e_2 \times b_1 e_1 + a_3 e_3 \times b_1 e_1$$

$$a_1 e_1 \times b_2 e_2 + a_2 e_2 \times b_2 e_2 + a_3 e_3 \times b_2 e_2$$

$$a_1 e_1 \times b_3 e_3 + a_2 e_2 \times b_3 e_3 + a_3 e_3 \times b_3 e_3$$

přerovnáme pořadí čísel a vektorů v součinech:

$$a_1 b_1 (e_1 \times e_1) + a_2 b_1 (e_2 \times e_1) + a_3 b_1 (e_3 \times e_1)$$

$$a_1 b_2 (e_1 \times e_2) + a_2 b_2 (e_2 \times e_2) + a_3 b_2 (e_3 \times e_2)$$

$$a_1 b_3 (e_1 \times e_3) + a_2 b_3 (e_2 \times e_3) + a_3 b_3 (e_3 \times e_3) =$$

spočítáme vektorové součiny v závorkách (podle tabulky výše)

$$a_1 b_1 \mathbf{o} + a_2 b_1 (-\mathbf{e}_3) + a_3 b_1 \mathbf{e}_2$$

$$a_1 b_2 \mathbf{e}_3 + a_2 b_2 \mathbf{o} + a_3 b_2 (-\mathbf{e}_1)$$

$$a_1 b_3 (-\mathbf{e}_2) + a_2 b_3 \mathbf{e}_1 + a_3 b_3 \mathbf{o}$$

Dáme k sobě násobky stejných vektorů:

$$(a_2 b_3 - a_3 b_2) \mathbf{e}_1 + (a_3 b_1 - a_1 b_3) \mathbf{e}_2 + (a_1 b_2 - a_2 b_1) \mathbf{e}_3$$

Teď už můžeme snadno určit souřadnice vektoru  $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (a_2 b_3 - a_3 b_2; a_3 b_1 - a_1 b_3; a_1 b_2 - a_2 b_1)$

**Př. 8:** Vzorec pro výpočet vektorového součinu ze souřadnic je velmi složitý. Zkus najít mnemotechnickou pomůcku pro jeho zapamatování.

Řešení na začátku příští hodiny.

**Pedagogická poznámka:** Předchozí odvození samozřejmě nezkouším a může se zdát zbytečné (vektorové součiny budou studenti v příští hodině počítat samozřejmě jinak). Na druhou stranu pokud ho studenti dělají sami a neopisují ho z tabule je to krásný příklad zdlouhavého výpočtu náročného na přesnost. Pokud odvození nestihneme dopočítat do konce, nic se neděje. Příští hodinu se k němu nevracíme, jenom ho ukážu s projektoru. Kdo o něj stojí dodělá si ho sám, pro ostatní velkou cenu nemá.

**Shrnutí:**